

الموافقة

الفبرول يعني الموافقة على فعل شيء ما، وعندما يتعلق الأمر بالجنس، فهذا يعني الموافقة على ممارسة الجنس أو الانخراط في نشاط جنسي.

ما عليك فعله

- تأكد من أنك تحصل على موافقة الأشخاص. ويشمل ذلك الشركاء الجنسيين المنتظمين.
- اطلب الحصول على موافقة عند القائم بأي فعل جنسي. فلا تفترض أن الموافقة على القيام بفعل جنسي معين يعني الموافقة على جميع الأفعال الأخرى.
- انتبه للغة الجسد. إذا بدا شخص ما غير مرتاح لكته قال نعم، فقد لا يكون راغباً بالفعل في ممارسة الجنس.



ما عليك ألا تفعله

- أن تفترض أن الموافقة معطاة بناء على ما يرتديه الشخص أو تصرفه.
- الضغط على شخص ما بالجماع معك. يجب أن تكون الموافقة قراراً حرراً وطوعياً.



في المملكة المتحدة، السن القانوني للموافقة على النشاط الجنسي هو 16 عاماً.

صُمم القانون لحماية الشباب من إساءة المعاملة من قبل البالغين. ولا يقصد به تحريم الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً ويمارسون الجنس، حيث يكون كلاً الشخصين في نفس العمر.
يمكنك التحدث إلى فريق الصحة الجنسية لدينا في سرية تامة.

أولاً

الأمراض المنقولة جنسياً

الأمراض المعدية المنقولة جنسياً (STI) هي الأمراض التي تنتقل عن طريق الجماع (الشرجي والفموي والمهبلي)، وكذلك عن طريق الاتصال الجنسي غير الجماعي (مشاركة الألعاب التناسلية) والاتصال الوثيق بين الأعضاء التناسلية.

قد تكون من صفات مميزة بعوى مفتوحة جنسياً ولا تعرفن ذلك.
لأن بعض الأشخاص لا تظهر عليهم أي أعراض.

الكلاميديا

الأعراض: الشعور بالماء عند التبول أو وجود افرازات أو نزيف بين الدورات الشهرية أو بعد الجماع.
اختبار الكشف عن المرض: عينة بول أو مسحة.
العلاج: يعالج باستخدام أقراص المضادات الحيوية.

السيلاين

الأعراض: وجود افرازات وتزيف بين الدورات الشهرية.
اختبار الكشف عن المرض: عينة بول أو مسحة.
العلاج: يعالج باستخدام المضادات الحيوية.

الزهري

الأعراض: بثور أو تقرحات حول المنطقة التناسلية/الشرجية (قد تكون مؤلمة أو غير مؤلمة)، وطفح جلدي في الجسم.

اختبار الكشف عن المرض: عينة دم.
العلاج: يعالج باستخدام المضادات الحيوية.

فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)

الأعراض: من الممكن الإصابة بمرض شبيه بالإلإنفلونزا بعد أسبوع فلية من الإصابة بالعدوى والطفح الجلدي.

اختبار الكشف عن المرض: اختبار وخز الإصبع أو عينة دم، اعتماداً على المكان الذي تختاره لإجراء الاختبار.

العلاج: السيطرة على المرض بالأدوية المضادة للفيروسات القهقرية. إذا كنت تتلقى علاجاً فعالاً ولا يمكن الكشف عن الحمل الفيروسي لديك، فلا يمكنك نقل فيروس نقص المناعة البشري إلى أي شخص آخر.

الهربس التناسلي

الأعراض: بثور أو تقرحات مؤلمة حول المنطقة التناسلية/الشرجية.
اختبار الكشف عن المرض: مسحة من البثرة أو القرحة.
العلاج: يعالج باستخدام الأقراص المضادة للفيروسات.

التأليل التناسلي

الأعراض: كتل أو تورمات أو زوارد حول المنطقة التناسلية/الشرجية.
اختبار الكشف عن المرض: سبقوم الطبيب/الممرضة بفحص المنطقة المصابة.
العلاج: يعالج باستخدام كريم أو علاج بالتجميد.

C-Card بطاقة

احصل على الواقي الذكري والمزلقات مجاناً من الصيدليات والعيادات والأماكن التعليمية باستخدام بطاقة C-Card المدتها لمن هم في سن ١٣ عاماً فأكثر.

امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئياً
للاطلاع على قائمة بالأماكن التي يمكنك
التسجيل فيها، وللحصول على مزيد من
المعلومات على موقعنا الإلكتروني.



اعتماداً على عمرك، قد تتمكن أيضاً من
التسجيل عبر الإنترنت.



وسائل منع الحمل الطارئة

يمكن أن توقف وسائل منع الحمل الطارئة حدوث الحمل بعد ممارسة الجنس دون استخدام وسائل منع الحمل أو في حالة فشل وسائل منع الحمل. يوجد خيارات لوسائل منع الحمل الطارئة مقدمة مجاناً من هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS):

- **اللوبل الرحمي الطارئ (اللوبل النخاسي)** - متاح في عيادات الصحة الجنسية ولدى بعض الممارسين العاملين.
- **وسائل منع الحمل الهرمونية الطارئة** - تسمى أحياناً "حبة الصباح التالي" - متوفرة في أماكن تقديم خدمات الصحة الجنسية ولدى الممارسين العاملين وبعض الصيدليات.

من الأفضل الحصول على وسائل منع الحمل الطارئة في أقرب وقت ممكن بعد ممارسة الجنس دون وقاية.



www.openclinic.org.uk

يتم تقديم خدمات الصحة الجنسية هذه من قبل اتحاد هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) التابع لشركة ميدلاندز بتوكيل من السلطة المحلية.



وسائل منع الحمل

إذا كنت تمارس الجنس، فإن استخدام وسائل منع الحمل هو الطريقة الأفضل لتقليل فرص حدوث الحمل. حيث توجد أنواع كثيرة لوسائل منع الحمل للاختيار من بينها وسائل متعددة تناسب مختلف الأشخاص. وبعض هذه الوسائل تتطلب إجراء ترتيبها وإذنها.

الحقنة

يتم حقن هرمون البروجسترون في العضل، وعادةً ما يكون في الأرداف.

- فعالة بنسبة تفوق ٩٩% في حالة الحقن في موعدها، وفقاً لما هو موصى به
- تستمر لمدة تصل إلى ١٤ أسبوعاً
- تتوقف الدورات الشهرية عادةً بعد حقن ٢-٣ حقن



غريبة منع الحمل

عبارة عن قطعة صغيرة بحجم عود التقباب تغزو هرمون البروجسترون، وترعرع تحت الجلد أعلى الرانع.

- فعالة بنسبة تفوق ٩٩%
- تستمر لمدة تصل إلى ثلاث سنوات
- يمكن أن تظل الدورة الشهرية كما هي أو تتوقف أو تكون أكثر تكراراً أو غير منتظمة

اللوبل الرحمي (اللوبل النخاسي)

عبارة عن جهاز صغير ينركن من البلاستيك والنحاس، ويوضع داخل الرحم.

- فعال بنسبة تفوق ٩٩%
- يدوم لمدة تصل إلى ١٠ سنوات
- قد تظل الدورة الشهرية كما هي، أو قد تتكون أقل أو أطول أو مولمة



الجوب المركيبة

قرص يحتوي على هرمون الإستروجين والبروجسترون.

- فعال بنسبة ٩١% مع الاستخدام المتعدد
- يتم تناوله كل يوم لمدة ٣ أسابيع على الأقل، مع استراحة أو يومين
- يمكن التحكم في وقت التزيف أو ما إذا كنت تزيف أو لا، وأغالباً ما يجعل الدورة الشهرية أخف وأقل ألم



الواقي الذكري (المهبل)

عبارة عن غشاء رقيق من البلاستيك يukkan المهبل ويعطي المخاطة الخارجية.

- فعال بنسبة ٨٥% تقريرياً مع الاستخدام المتعدد
- يقي من الأمراض المعدية المنقولة (STIs) جنسياً



الواقي الذكري (القضيب)

عبارة عن غشاء رقيق من اللاتكس أو البلاستيك يوضع حول القضيب الذكري المتخصص.

- فعال بنسبة ٨٥% تقريرياً مع الاستخدام المتعدد
- يقي من الأمراض المعدية المنقولة جنسياً

